

**VEUILLEZ LIRE POUR ASSURER L'UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE
DU MÉDICAMENT**

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT DESTINÉS AUX PATIENTS

ACCEL-HYOSCINE
Comprimés de butylbromure d'hyoscine
Norme-fabricant

Avant de commencer à prendre **ACCEL-HYOSCINE**, veuillez lire attentivement l'information qui suit. Ce dépliant sert de résumé et, par conséquent, ne contient pas tous les renseignements disponibles au sujet de ce médicament. Veuillez discuter de votre affection médicale et de votre traitement avec votre professionnel de la santé, et demandez-lui si de nouveaux renseignements sont disponibles au sujet de **ACCEL-HYOSCINE**.

À quoi servent les comprimés ACCEL-HYOSCINE?

- Pour le soulagement des spasmes abdominaux (crampes abdominales), de la douleur et des malaises dans :
 - l'estomac,
 - les intestins,
 - les voies biliaires.

Comment agissent les comprimés ACCEL-HYOSCINE?

- Les crampes abdominales (spasmes abdominaux) sont causées par le resserrement soudain et puissant des muscles.
- Ce médicament sert à soulager les crampes (spasmes), la douleur et les malaises en relâchant les muscles contractés :
 - de l'estomac,
 - des intestins;
 - des voies biliaires.

Ingrédients contenus dans les comprimés ACCEL-HYOSCINE :

Ingrédient médicamenteux : Butylbromure d'hyoscine.

Ingrédients non médicamenteux : alcool polyvinylique, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, lactose monohydraté, lécithine (soya), macrogol, stéarate de magnésium, povidone, talc

Présentations d'ACCEL-HYOSCINE :

Comprimés, 10 mg.

Ne pas utiliser les comprimés ACCEL-HYOSCINE si vous :

- êtes allergique :
 - au butylbromure d'hyoscine;
 - aux agents atropiniques;
 - à l'un des ingrédients du produit (voir la liste des **Ingrédients contenus dans les comprimés ACCEL-HYOSCINE**).
- vous présentez un des troubles suivants :
 - maladie caractérisée par la diminution du volume des muscles (myasthénie grave);
 - pression élevée dans l'œil (glaucome à angle fermé) non traitée;
 - rétrécissement des parties du tractus gastro-intestinal (sténose);
 - difficulté à uriner en raison de problèmes de prostate;
 - votre intestin a cessé de fonctionner ou peut être bloqué;
 - Les symptômes comprennent:
 - douleur abdominale sévère avec absence de selles,
 - nausées,
 - vomissements
 - augmentation du volume du côlon (mégacôlon).
- êtes enceinte ou susceptible de tomber enceinte, ou vous allaitez.

Afin d'éviter les effets secondaires et d'assurer l'utilisation appropriée du médicament, consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ACCEL-HYOSCINE. Informez-le de toute affection médicale ou de tout problème que vous pouvez avoir, notamment si vous :

- êtes un homme et avez des problèmes de prostate;
- présentez un risque de glaucome à angle fermé (pression élevée dans les yeux)
- risquez d'avoir des problèmes à uriner en raison d'un blocage
- présentez un risque de tachyarythmie (fréquence cardiaque élevée)
- souffrez de reflux d'acide gastrique dans la gorge (reflux gastro-œsophagien);
- présentez ou présentez un risque de blocage de votre tractus gastro-intestinal. Cela comprend votre œsophage, votre estomac, vos intestins et votre anus.
- avez une inflammation intestinale (p. ex., colite ulcéreuse);

Autres avertissements à connaître:

Vous ne devez pas prendre ACCEL-HYOSCINE quotidiennement pendant une longue période. Votre professionnel de la santé devrait rechercher la cause de vos douleurs à l'estomac. Discutez avec votre professionnel de la santé de la durée de votre traitement d'ACCEL-HYOSCINE.

Si les événements suivants surviennent après avoir pris ACCEL-HYOSCINE, consultez immédiatement un médecin :

- si vous avez des douleurs à l'estomac sévères et inexplicables qui ne disparaissent pas ou s'aggravent
- si vous avez des douleurs à l'estomac sévères et inexplicables qui surviennent avec

d'autres symptômes tels que:

- fièvre
- nausée
- vomissements
- changements dans les selles
- sensibilité abdominale
- diminution de la pression artérielle
- évanouissement
- sang dans les selles

Veillez informer votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce. Les médicaments suivants peuvent causer des interactions avec ACCEL-HYOSCINE :

- Amantadine, un médicament utilisé pour prévenir ou traiter certaines infections grippales (de type A).
- Anticholinergiques (p. ex., ipratropium, atropine).
- Antihistaminiques, des médicaments utilisés pour traiter les allergies (p. ex., diphenhydramine, hydroxyzine).
- Agents bêta-adrénergiques, des médicaments utilisés pour traiter les symptômes de l'asthme, de la bronchite, de l'emphysème et d'autres maladies pulmonaires (p. ex., salbutamol).
- Antagonistes dopaminergiques, des médicaments utilisés pour prévenir les vomissements (p. ex., métoclopramide).
- Médicaments pour le cœur (p. ex., disopyramide, quinidine).
- Inhibiteurs de la MAO, des médicaments utilisés pour traiter la dépression et les troubles de l'humeur (p. ex., moclobémide, sélégiline, tranylcypromine, phénelzine).
- Antidépresseurs tricycliques, des médicaments utilisés pour traiter l'anxiété ou la dépression (p. ex., amitriptyline, doxépine).

Si vous prenez des anti-acides ou antidiarrhéiques adsorbants, votre professionnel de la santé pourrait vous demander de les prendre au moins une heure avant de prendre ACCEL-HYOSCINE.

Comment prendre les comprimés ACCEL-HYOSCINE :

Dose habituelle (adultes) :

- Prendre 1 à 2 comprimés par jour. Ne pas prendre plus de 6 comprimés par jour.
- En cas de maladie chronique, votre médecin peut recommander la prise d'un comprimé 3 à 5 fois par jour. Ne pas prendre plus de doses que le nombre recommandé.
- Avaler les comprimés entières avec un verre d'eau.

Surdosage :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de ACCEL-HYOSCINE, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Omission de dose :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez la prochaine dose comme prévu. Ne doublez pas la dose.

Quels sont les effets secondaires possibles des comprimés ACCEL-HYOSCINE?

Ce médicament peut parfois causer :

- une sécheresse de la bouche;
- une diarrhée;
- une nausée;
- une sensation de chaleur et une diminution de la transpiration;
- une augmentation de la fréquence cardiaque;
- une incapacité à uriner;
- une augmentation de la pression du liquide à l'intérieur des yeux;
- d'autres effets secondaires rares tels que :
 - réactions allergiques (éruptions cutanées, démangeaisons);
 - réactions cutanées (urticaire, éruptions cutanées, rougeur de la peau, démangeaisons);
 - enflure rapide de la peau et des tissus cutanés (œdème de Quincke);
 - difficulté à respirer (habituellement chez les patients souffrant d'asthme ou d'allergies).

Des réactions allergiques graves et un choc allergique grave n'ont été signalés que très rarement.

Si vous éprouvez l'un ou l'autre de ces effets et que ceux-ci persistent ou deviennent incommodants ou si vous présentez des effets secondaires non mentionnés dans cette liste, consultez votre professionnel de la santé.

Déclaration d'effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé :

- en visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur la façon de faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Conserver à la température ambiante (entre 15 et 30 °C). Le produit demeure stable jusqu'à la date d'expiration imprimée sur l'étiquette.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur ACCEL-HYOSCINE :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Procurez-vous le Guide thérapeutique complet préparé à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) ou auprès de Accel Pharma Inc. au www.accelpharma.com ou par téléphone au **1-877-822-2235**.

Ce dépliant a été préparé par Accel Pharma Inc.

Dernière révision : 30 novembre 2021